

# PROGRAMA DE AVALIAÇÃO

**1. O diagnóstico de Deficiência Mental é dado a partir do:**

- a) déficit de inteligência e comportamento adaptativo;
- b) déficit de inteligência e de aprendizado;
- c) déficit de inteligência e de afetividade;
- d) n.d.a.

**2) A causa genética mais frequente de deficiência mental é:**

- a) Síndrome de Down;
- b) Síndrome do X frágil;
- c) Hipotireoidismo congênito;
- d) n.d.a.

**3) O "continuum" autístico, descrito por L. Wing, leva em consideração básica:**

- a) o comportamento;
- b) a linguagem;
- c) a variação de inteligência;
- d) n.d.a.

**4) Para se explicar o déficit cognitivo no Autismo, utiliza-se atualmente a teoria desenvolvida por U. Frith denominada:**

- a) Teoria do Apego;
- b) Teoria da Mente;
- c) Teoria do Vínculo;
- d) n.d.a.

**5) Os esquemas de causalidade e persistência do objeto surgem por ocasião do período:**

- a) Sensório-motor;
- b) Pré-operatório;
- c) Operações concretas;
- d) n.d.a.

**6) O jogo simbólico ocorre concomitantemente com o aparecimento do:**

- a) Pensamento abstrato;
- b) Pensamento concreto;
- c) Pensamento pré-operatório;
- d) n.d.a.

**7) A noção de morte na criança estrutura-se no período:**

- a) pré-operatório;
- b) de operações concretas;
- c) de operações formais;
- d) n.d.a.

**8) O principal tratamento medicamentoso no déficit de atenção é:**

- a) Fluoxetina;
- b) Fluvoxamina;
- c) Metilfenidato;
- d) n.d.a.

**9) Na anorexia nervosa o peso corporal está abaixo do esperado em:**

- a) 30%
- b) 15%
- c) 5%
- d) n.d.a.

**10) Qual droga não é usada na terapêutica da anorexia nervosa?**

- a) cipro-heptadina;
- b) IMAOs;
- c) Lítio;
- d) n.d.a.

*Respostas: 1) a; 2) a; 3) c; 4) b; 5) a; 6) c; 7) b; 8) c; 9) b; 10) d.*